

Gebrauchsanweisung
Bitte aufmerksam lesen!



Magen-Darm Entspannungstabletten

Wirkstoff: Simeticon

Zusammensetzung

1 Kautablette enthält 125 mg Simeticon

Sonstige Bestandteile:

Dextrates, Sorbitol, Tricalciumphosphat, Saccharose, Maisstärke, Talkum, Citronensäure, wasserfrei; Pfefferminzaroma

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 20 Kautabletten

Hersteller:

HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert Str. 5
D-23562 Lübeck

Ein Produkt der Abtei OP Pharma GmbH,
Abtei 1, D-37696 Marienmünster

Zweckbestimmung

Entschäumer

Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm Beschwerden, z. B. Völlegefühl, Aufstoßen, Blähungen.

Hinweis: Bei neu auftretenden und / oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten diese medizinisch abgeklärt werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Magen-Darm Entspannungstabletten nicht anwenden?

Nicht angewendet werden sollten Magen-Darm Entspannungstabletten bei einer bekannten Hypersensivität gegen Simeticon oder einen anderen Bestandteil von Magen-Darm Entspannungstabletten.

Magen-Darm Entspannungstabletten bei Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre nicht anwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Magen-Darm Entspannungstabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Bei neu auftretenden und / oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u. U. zugrunde liegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Mittel beeinflussen die Wirkung von Magen-Darm Entspannungstabletten?
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Magen-Darm Entspannungstabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Magen-Darm Entspannungstabletten sonst nicht richtig wirken können!

Bei gasbedingten Magen-Darm Beschwerden: Sofern vom Arzt nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bis zu 6 Tabletten täglich nach Bedarf zu oder nach den Mahlzeiten ein.

Wie und wann sollten Sie Magen-Darm Entspannungstabletten einnehmen?

Magen-Darm Entspannungstabletten werden zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen eingenommen. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Magen-Darm Entspannungstabletten können, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden.

Die Kautabletten sollten gut zerkaut eingenommen werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Der Wirkstoff von Magen-Darm Entspannungstabletten bringt den Schaum im Magen-Darm Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung praktisch ausgeschlossen. Auch große Mengen Magen-Darm Entspannungstabletten werden problemlos vertragen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Magen-Darm Entspannungstabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Führen Sie die Einnahmen fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Magen-Darm Entspannungstabletten auftreten?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Magen-Darm Entspannungstabletten wurden bisher nicht beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Medizinproduktes

Das Verfallsdatum des Medizinproduktes ist auf der Durchdrückpackung und der Umverpackung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Magen-Darm Entspannungstabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Medizinprodukt trocken und nicht über 25°C auf.

Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information

Juli 2012

CE 0482

